

つらい痛みをジカにとる

インドメタシン(0.5%)配合

# サロンシップ® インドメタシンEX

〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤

## 商品の特長

- インドメタシン配合で優れた鎮痛消炎効果  
腰や関節などのしつこい痛みの元に直接作用する「インドメタシン」がジワリと浸透し、優れた鎮痛消炎効果を発揮します。
- 保湿チャック付き  
内袋には、保管に便利な保湿チャックがついていて、シップ剤の乾燥を防ぎます。

## ⚠️【使用上の注意】

**❌ してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目の周囲、粘膜等。
  - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
  - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

## 🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症 状                       |
|------|---------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

**【効能・効果】** 関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、腰痛、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

**【用法・用量】** プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 本剤は痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

**【成分・分量】** 膏体100g中 インドメタシン……0.5g

添加物として、エデト酸Na、N-メチル-2-ピロリドン、L-メントール、カオリン、カルボキシビニルポリマー、カルボキシメチルセルロースNa、グリセリン、ケイ酸アルミン酸Mg、酸化チタン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、水を含みます。


**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 未使用分は袋に入れ、開口部のチャックを閉めるか又は開口部を折りまげて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

《包装》10cm × 14cm …………… 12枚入、24枚入

---

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>  
久光製薬お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00—17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元 **東光薬品工業株式会社** 〒123-0865 東京都足立区新田2-16-23